

Kapcsolattartási információk

A beteg neve:

Felíró orvos neve:

Felíró orvos telefonszáma:

Lunsumio-kezelés kezdetének dátuma:

További információért olvassa el a betegájékoztatót.

Vállalat elérhetősége:

Roche (Magyarország) Kft.,
1112 Budapest, Balatoni út 2/a

Tel.: + 36 1 279 4500

e-mail: hungary.medinfo@roche.com

▼ *Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Ehhez Ön is hozzájárulhat a tudomására jutó bármilyen mellékhatás bejelentésével.*

NNGYK jóváhagyás dátuma: 2025.05.16.

Verziószám: 2.0

RMP verziószám: 2.0

Azonosító szám: M-HU-000001104

Roche

Fontos kockázatcsökkentési útmutató
***LUNSUMIO*-val ▼ (*moszunetuzumab*)**
kezelt betegek részére

Betegkártya

- Mindig tartsa magánál ezt a kártyát, amíg Lunsumio-t kap!
- Mutassa meg ezt a kártyát az összes olyan orvosnak, aki a kezelésében részt vesz!

Információ a beteg/gondozó számára

Keresse fel kezelőorvosát vagy **azonnal** kérjen orvosi segítséget, ha az alábbi tünetek **bármelyikét** észleli:

Citokin felszabadulási szindróma (CRS) tünetei, amelyekre figyelni kell:

- láz (38°C-os vagy magasabb)
- gyors vagy rendszertelen szívverés
- hidegrázás
- zavartság
- súlyos fáradtság vagy gyengeségérzés
- nehézlégzés
- szédülés vagy kábultság
- ájulás vagy homályos látás
- hűvös vagy sápadt, nyirkos bőr
- fejfájás

Immuneffektor sejt-asszociált neurotoxicitási szindróma (ICANS) tünetei, amelyekre figyelni kell:

- zavartság vagy tájékozódási zavar
- hallucináció (nem létező dolgok látása, hallása vagy érzékelése)
- görcsrohamok
- memóriaproblémák
- beszédzavar (nehézségek a beszéddel vagy a beszéd megváltozása)
- problémák az ítélőképességgel (megváltozott gondolkodás)
- összpontosítási zavar (nehézséget okoz ébren maradni)

Információ a kezelőorvos számára

Ez a beteg Lunsumio-kezelésben részesül, **ami citokin felszabadulási szindrómát (CRS) és immuneffektor sejt-asszociált neurotoxicitási szindrómát (ICANS) okozhat.**

- Azonnal vizsgálja ki a beteget és kezelje a tüneteket.
- Ha CRS gyanúja merül fel, olvassa el az alkalmazási előírás 4.2 és 4.4. pontjaiban leírt előírásokat a CRS kezeléséhez.
- Ha ICANS gyanúja merül fel, olvassa el az alkalmazási előírás 4.2 és 4.4. pontjaiban leírt előírásokat az ICANS kezeléséhez.
- **Keresse fel a felíró orvost**, amint lehetséges, mert elképzelhető, hogy módosítania kell a következő Lunsumio-infúziót.