

Daganatos megbetegedések kockázata

Az upadacitinib-kezelés mellett nagyobb lehet a daganatos megbetegedések, elsősorban a bőrrák kialakulásának kockázata.

Tájékoztassa kezelőorvosát bármilyen, korábban nem észlelt bőrelváltozás vagy új bőrkinövés megjelenéséről.

Gyomor-bél perforáció kockázata

Az upadacitinib növelheti a gyomor-bél perforáció kialakulásának kockázatát, különösen akkor, ha Ön Crohn-betegségben szenved. Haladéktalanul tájékoztassa kezelőorvosát, ha váratlan vagy más okkal nem magyarázható hasi fájdalmat tapasztal.

Ezt a betegkártyát mutassa meg valamennyi orvosnak, akivel Ön kapcsolatba kerül, például fogorvosának, illetve a sürgősségi osztályon dolgozó szakorvosnak is!

Kérjük, hogy bármely gyógyszerrel kapcsolatos feltételezett mellékhatást jelentsen a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) www.nngyk.gov.hu honlapon megtalálható online bejelentő-felületen keresztül, vagy a forgalomba hozatali engedély jogosultjának az alábbi elérhetőségeik egyikén: Telefon: +36 1 455 8600, e-mail: pharmacovigilance.hu@abbvie.com

Beteg neve:

Kezelőorvos neve:

Kezelőorvos telefonszáma:

A RINVOQ-kezelés kezdésének időpontja:

Verzió 4.0; HU-RNQR-250011; (Központi verzió 5., Feb2025);
NNGYK jóváhagyás dátuma: 2025.10.15.
Abbvie jóváhagyás dátuma: 2025.10.20.



abbvie

Betegkártya

Kérjük, ezt a kártyát mindig tartsa magánál!

RINVOQ kezelésben részesülő betegek számára

- Ez a kártya fontos gyógyszerbiztonsági információkat tartalmaz, amit tudnia kell a kezelés megkezdése előtt, illetve a kezelés során.
- További információért kérjük, olvassa el a betegtájékoztatót!

Abbvie Kft, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

Fertőzések kialakulásának kockázata

Az upadacitinib-kezelés mellett nagyobb a kockázata fertőzés, pl: tuberkulózis (TBC), övsömör vagy vírusos májgyulladás (hepatitisz) jelentkezésének vagy a meglévő fertőzés rosszabbodásának.

Haladéktalanul tájékoztassa kezelőorvosát, amennyiben fertőzés tüneteit észleli, úgymint:

- Láz, hidegrázás, szokatlan izzadás, súlyvesztés vagy tartósan fennálló köhögés – ezek a TBC tünetei lehetnek.
- Fájdalmas hólyagos bőrkiütések – ezek az övsömör tünetei lehetnek.
- Fáradtság, légszomj – ezek a tüdőgyulladás tünetei lehetnek.

Mondja el orvosának, ha:

- nemrégiben TBC-t diagnosztizáltak Önnél, vagy valaha TBC-ben szenvedett.
- a közelmúltban szoros kapcsolatban állt valakivel, akinél TBC-t diagnosztizáltak.

Védőoltások – fertőzések megelőzése

Élő kórokozót tartalmazó oltások (például, bárányhimlő, kanyaró/mumpsz/rubeola elleni oltás) adása nem javasolt a kezelés alatt, vagy közvetlenül a kezelés megkezdése előtt. Mielőtt bármilyen védőoltásban részesülne, kérdezze meg kezelőorvosát, melyek azok a védőoltások, melyeket nem kaphat meg közvetlenül a kezelés megkezdése előtt, vagy a kezelés alatt.

Szívbetegség

Az upadacitinib-kezelés mellett a koleszterinszint (vérzsírok) emelkedését észlelték. A kezelés során kezelőorvosa rendszeresen ellenőrizni fogja a koleszterinszintjét.

Haladéktalanul tájékoztassa kezelőorvosát, ha mellkasi fájdalmat vagy nyomást érez – ezek a tünetek szívbetegségre utalhatnak.

Fogamzásgátlás, terhesség és szoptatás

A készítmény terhesség alatt nem alkalmazható.

- Hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazni a készítmény szedése alatt és az utolsó adag bevétele után még legalább 4 hétig. A hatékony fogamzásgátlás lehetőségeit beszélje meg kezelőorvosával.
- Amennyiben gyermekvállalást tervez vagy teherbe esik, haladéktalanul tájékoztassa kezelőorvosát.
- Ne szoptasson a készítmény szedés mellett.

Vérrög a lábokban vagy a tüdőben

Az upadacitinib-kezelés mellett a vénákban és a tüdőben egyes esetekben vérrög kialakulását észlelték. Haladéktalanul szóljon kezelőorvosának, ha vérrög kialakulására utaló tünetek, úgymint fájdalmas duzzadt láb, légszomj, vagy mellkasi fájdalom jelentkeznek.