

BETEGKÁRTYA

Xavipiran 2,5 mg/50 mg kemény kapszula

- ♦ **Mindig tartsa magánál ezt a kártyát.**
- ♦ **Mutassa meg ezt a kártyát minden orvosnak vagy fogorvosnak a kezelés előtt.**

Xavipiran (rivaroxabán/acetilszalícilsav) véralvadásgátló kezelésben részesülök.

Név:

Lakcím:

Születési dátum:

Testtömeg:

Egyéb gyógyszerek/egészségi állapotok:

Vészhelyzet esetén kérem, értesítse:

Orvos neve:

Orvos telefonszáma:

Orvos pecsétszáma:

Kérem, értesítse továbbá:

Név:

Telefonszám:

Kapcsolat a beteggel:

Információ egészségügyi szakemberek számára:

- ♦ A nemzetközi normalizált arány (INR) értéket nem szabad használni, mivel ez nem megbízható mérőszáma a Xavipiran véralvadásgátló aktivitásának.

Mit kell tudnom a Xavipiranról?

- ♦ A Xavipiran hígítja a vért, ami megakadályozza a veszélyt jelentő vérrögzépződést.
- ♦ A Xavipirant pontosan a kezelőorvosa által előírt módon kell szednie. A vérrögzépződés elleni optimális védelem érdekében soha ne hagyjon ki egyetlen adagot sem.
- ♦ Semmiképpen ne hagyja abba a Xavipiran szedését anélkül, hogy ezt először megbeszélne kezelőorvosával, mivel megnőhet a vérrögök kialakulásának kockázata.
- ♦ Mielőtt elkezdi szedni a Xavipiran-t, tájékoztassa a kezelését végző egészségügyi szakembert minden olyan gyógyszerről, amelyet jelenleg szed, nemrégiben szedett, vagy amelyet szedni tervez.
- ♦ Bármilyen műtét vagy invazív beavatkozás előtt tájékoztassa a kezelését végző egészségügyi szakembert arról, hogy Xavipirant szed.

Mikor kell a kezelőorvoshoz vagy a gyógyszerészhez fordulnom?

Vérhígító, például a Xavipiran szedése esetén fontos tisztában lenni a gyógyszer lehetséges mellékhatásaival. A vérzés a leggyakoribb mellékhatás. Ha tudja, hogy Önnél fennáll a vérzés veszélye, ne kezdje el a Xavipiran szedését, csak akkor, ha ezt először megbeszélte kezelőorvosával. Azonnal tájékoztassa a kezelését végző egészségügyi szakembert, ha a következők bármelyikét tapasztalja:

- ♦ fájdalom;
- ♦ duzzanat vagy kellemetlen érzés;
- ♦ fejfájás, szédülés vagy gyengeség;
- ♦ szokatlan véraláfutások, orrvérzés, ínyvérzés, olyan vágott sérülések, amelyek esetében a vérzés elállítása hosszú időt vesz igénybe;
- ♦ a szokásosnál erősebb menstruációs vérzés vagy hüvelyi vérzés;
- ♦ vér a vizeletben, amely lehet rózsaszín vagy barna; piros vagy fekete széklet;
- ♦ vér felköhögése, vagy vérhányás, illetve kávézaccra hasonlító hányadék.

Hogyan kell szednem a Xavipirant?

- ♦ Az optimális védelem biztosítása érdekében a Xavipiran 2,5 mg/50 mg kemény kapszula bevehető étkezés közben vagy attól függetlenül is.