

REBLOZYL®kezelés alatt állok.

Fontos elérhetőségi adatok

A készítményt felíró orvos:

Neve:

A rendelő telefonszáma:

Az intézmény címe:

.....

REBLOZYL®
(luszpatercept)

Betegkártya
(Fogamzóképes nőknek)

Betegeknek szóló tájékoztató

A luszpatercept nem használható terhesség alatt és a teherbeesést megelőző 3 hónapban. A luszpatercept károsíthatja a születendő gyermeket.

Ne használja a luszpaterceptet, ha terhes vagy szoptat, vagy ha fennáll Önnél a teherbeesés lehetősége, és nem alkalmaz legalább egy hatékony fogamzásgátlási módszert.

- A luszpatercept-kezelés megkezdése előtt:
 1. Kezelőorvosa által ellenőrzött negatív terhességi teszttel kell rendelkeznie.
 2. Meg kell beszélnie a hatékony fogamzásgátló módszereket orvosával, és legalább egy hatékony fogamzásgátlási módszert kell alkalmaznia a luszpatercept-kezelés alatt, és az utolsó adag alkalmazása után még legalább 3 hónapig.
- A terhességi tesztet az orvos megítélése szerint megfelelő időközönként meg kell ismételni.
- Azonnal beszéljen kezelőorvosával, ha úgy gondolja, hogy teherbe esett a luszpatercept-kezelés alatt, vagy a luszpatercept-kezelés befejezését követő 3 hónapon belül.

A Betegkártya hátoldalán találja orvosa elérhetőségét.

A luszpatercept hatásaival és mellékhatásaival kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a készítmény Betegtájékoztatóját.

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát.

Kérjük, hogy bármely feltételezett mellékhatást jelentsen a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (NNGYK) a www.ogyei.gov.hu honlapon megtalálható online bejelentő-felületen keresztül, vagy a honlapról letölthető mellékhatás-bejelentő lapon, melyet visszaküldhet e-mailben (adr.box@nngyk.gov.hu), vagy levélben (NNGYK, 1372 Budapest, Pf. 450.).